

# РТУТЬ

## ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРИ ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ

Пари ртуті є надзвичайно отруйними, навіть в невеликих кількостях можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям



## ЯК РОЗПІЗНАТИ?

- Важкий сріблясто-білий метал, рідкий за кімнатної температури, легко випаровується
- Широко застосовується у виробництві та в домашньому приладді (люмінесцентні лампи, ртутні термометри, батарейки)
- Може накопичуватися в рибі, молюсках в якості ще більш токсичної сполуки – метилртуть



## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Ізолюйте приміщення від людей, щільно зачиніть двері та відчиніть вікна
- Одягніть на руки гумові рукавички, а на ноги бахіли; обличчя захистіть вологою марлею
- Ретельно зберіть кульки ртуті у герметичну тару зі спеціальним розчином (наприклад, мильно-содовим). Для збору можна використати спринцівку, серветки, скотч, аркуш паперу, змочений олією, або ватні кульки, змочені водою
- Забруднені речі складіть в поліетиленові пакети та здайте на утилізацію
- Не викидайте ртуть до сміттєпроводу, в каналізацію, не витрушуйте з балкона
- Не використовуйте для збору ртуті пилосос або віник!
- Після механічного збирання ртуті потрібно провести нейтралізацію



## СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ

ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ 8-24 ГОДИНИ

- Мідно-червоне забарвлення слизових рота та глотки, металевий присмак у роті
- Розлад шлунку, нудота, блювота, болі в животі
- Можливе підвищення температури тіла до 39 °С
- Сильний головний біль та болі при ковтанні
- Почервоніння, набухання і кровоточивість ясен
- Частий пульс, серцева слабкість
- Судоми литкових м'язів
- Зниження апетиту, втрата ваги
- Загальна слабкість, сонливість, дратівливість
- У важких випадках знижується працездатність, розумова діяльність, пам'ять
- Розвивається «ртутний тремор» – тремтіння пальців рук, повік, губ та ніг, що є типовими ознаками ртутної неврастенії



## ПЕРША ДОПОМОГА

- Викличте бригаду швидкої допомоги або зверніться за кваліфікованою допомогою до найближчого медичного закладу
- Вийдіть на свіже повітря, зберігайте тепло і спокій
- При потраплянні ртуті всередину організму через рот (зазвичай це стосується маленьких дітей), терміново промийте шлунок, випийте 20-30 г активованого вугілля та забезпечте пиття молока у великій кількості для більш швидкого виведення отруйних сполук із сечею
- Прополощіть рот та горло, ретельно почистіть зуби



ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 101

ПРИ ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ ІЗ РТУТТЮ



ОБСЕ